

**PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN**  
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ.

## Magnicur Fungimat

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspo emulze (SE) určený k ochraně růží proti padlí, černé skvrnitosti a rzi, okrasných rostlin proti padlí a rzím a zimostrázu proti skvrnitosti listů a cylindrokládové skvrnitosti listů.  
Pro neprofesionální použití.

**Název a množství účinné látky:** tebukonazol 25 g/l (2,5 % hmot.)

**Označení přípravku:**

### VAROVÁNÍ



H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.	
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.	
P391 Uniklý produkt seberte.	
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.	
EUH208 Obsahuje směs isothiazolonů. Může vyvolat alergickou reakci.	
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.	
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).	
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody. Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.	
SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.	
<b>Držitel povolení:</b>	SBM Développement S.A.S. 60 Chemin des Mouilles 69130 Ecully Francie
<b>Právní zástupce:</b>	SBM Life Science s.r.o. Bucharova 2657/12 158 00 Praha 5, tel. 226 226 346
<b>Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu:</b>	TARGET S.A. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5 84-110 Krokowa Polsko

<b>Evidenční číslo přípravku:</b>	<b>5337-2</b>
-----------------------------------	---------------

<b>Číslo šarže:</b>	vedeno na primárním obalu
<b>Datum výroby formulace:</b>	vedeno na primárním obalu

<b>Doba použitelnosti:</b>	2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +35 °C
----------------------------	---

<b>Množství přípravku v obalu:</b>	50 ml – 500 ml v HDPE láhvi (Balení je opatřeno odměrkou)
------------------------------------	--

### Způsob působení

Přípravek obsahuje systémově působící tebukonazol, který se vyznačuje preventivní a částečnou kurativní účinností a dlouhou dobou působení (až 14 dnů).

### Návod k použití/rozsah povoleného použití

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
růže	padlí růžové, černá skvrnitost růže, rez růžová	0,4-0,6 % (4-6 ml/l vody)	-	1) od: 10 BBCH 2) při prvním výskytu	4) do počátku skanutí
okrasné rostliny	padlí, rzi	0,4 % (4 ml/l vody)	-	1) od: 10 BBCH 2) při prvním výskytu	4) do počátku skanutí
zimostráz	skvrnitosti listů, cylindrokládiová skvrnitost listů	0,4 % (4 ml/l vody)	-	1) od: 10 BBCH 2) při prvním výskytu	4) do počátku skanutí

(-)- ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
okrasné rostliny, růže	postřik	4x	7-14 dnů
zimostráz	postřik	6x	7-14 dnů

### Upřesnění použití

Odstupňování dávek přípravku u růží podle velikosti rostlin:

Výška rostlin 50 cm a méně - 6 ml/l vody

Vyšší rostliny - 4 ml/l vody

Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostli/menší ploše.

### Další omezení

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!

Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný po zaschnutí, ideálně však až druhý den.

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí.

Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty ochranné prostředky, které nelze prát.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

### Příprava aplikační kapaliny

Uvedeno v bodu „Další údaje a upřesnění“.

### Čištění zařízení pro aplikaci přípravků

Uvedeno v bodu „Další údaje a upřesnění“.

## **Osobní ochranné pracovní prostředky**

**Ochrana dýchacích orgánů:** není nutná.

**Ochrana rukou:** gumové nebo plastové rukavice.

**Ochrana očí a obličeje:** není nutná.

**Ochrana těla:** ochranný oděv a nepromokavý plášť nebo turistická pláštěnka.

**Dodatečná ochrana hlavy:** není nutná; čepice se štítkem nebo klobouk v případě ručního postřiku – ve výšce hlavy nebo směrem nahoru.

**Dodatečná ochrana nohou:** pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) s ohledem na práci v zahrádkářském terénu.

Poškozené ochranné prostředky (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

## **Informace o první pomoci**

**Všeobecné pokyny:** Projeví-li se zdravotní potíže (alergická kožní reakce) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

**První pomoc při nadýchání:** Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

**První pomoc při zasažení kůže:** Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

**První pomoc při zasažení očí:** Vyplachujte oči velkým množstvím vlažné čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

**První pomoc při náhodném požití:** Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

## **Skladování**

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých a větratelných prostorech při teplotách +5 °C až +35 °C odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku.

## **Likvidace obalů a zbytků**

Prázdné obaly, případně zbytky přípravku, se odloží jako nebezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných k tomu určených kontejnerů.

## **Další údaje a upřesnění**

Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu přípravku.

## **Příprava aplikační kapaliny**

Přípravek v obalu je třeba nejprve homogenizovat protřepáním. Potom se odměřené množství přípravku vlije do nádrže postřikovače naplněné polovičním množstvím potřebné vody a poté se doplní zbývajícím množstvím vody a následně důkladně promíchá. Aplikační kapalinu spotřebujte do jednoho dne od přípravy. Připravujte pouze nezbytné množství.

## **Technika aplikace**

Přípravek se aplikuje postřikovačem. Ošetření se provádí preventivně nebo nejpozději při prvních příznacích choroby. Postříkujte důkladně listy a stonky do takové míry, aby nedocházelo ke stékání (do skanutí – na listech se tvoří kapky). Je třeba ošetřit celou rostlinu včetně spodní strany listů.

Ošetření neprovádějte za slunečního svitu a za sucha (kořeny rostlin jsou suché). Neošetřujte

Vytvořeno: 11.01.2016

Revize:

rostliny v době plného květu. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Přípravek může zanechat skvrny. Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše.

### **Čištění zařízení pro aplikaci přípravků**

Postřikovač po aplikaci důkladně vypláchněte vodou a výplachovou kapalinu poté vystříkejte na naposledy ošetřovanou plochu.

#### **Dodatková informace společnosti SBM Développement S.A.S.**

*Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití.*

*Přípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v textu etikety anebo nejsou součástí písemných doporučení společnosti SBM Développement S.A.S., platných pro aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin.*

*V případě použití jakékoliv kombinace předem odzkoušejte vzájemnou mísitelnost jednotlivých zamýšlených složek.*

*Společnost SBM Développement S.A.S. nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či skladováním přípravku.*